

Monte Mor, 30 de julho de 2012.

**PROCESSO SELETIVO – EDITAL nº 02/2012**

**CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

**GABARITO**

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 1- C  | 11- C | 21- A |
| 2- A  | 12- B | 22- B |
| 3- C  | 13- D | 23- D |
| 4- B  | 14- B | 24- D |
| 5- B  | 15- D | 25- C |
| 6- D  | 16- B | 26- B |
| 7- D  | 17- B | 27- B |
| 8- C  | 18- B | 28- C |
| 9- B  | 19- A | 29- D |
| 10- C | 20- B |       |

**30-**

- 1- Lavagem das mãos
- 2- Separar todo o material necessário para a sondagem vesical
- 3- material para higiene íntima (comadre, água e sabão neutro, luvas de procedimento) material para sondagem vesical de demora (sonda vesical de demora, bolsa coletora, kit de cateterismo vesical, xilocaína gel 2%, ampola de soro fisiológico, seringa de 20ml, solução tópica para antissepsia (povidine/ clorexidine,etc), luva estéril)
- 4- lavar as mãos explicar o procedimento ao paciente
- 5- calçar luva de procedimento
- 6- realizar higiene íntima do paciente
- 7- colocar o paciente e posição para passagem de sondagem vesical
- 8- Descartar o material da higiene íntima utilizado
- 9- lavar as mãos
- 10- abrir todo material mantendo a esterilidade do material
- 11- colocar solução tópica na cúpula para antissepsia

- 12- calçar a luva estéril e
- 13- abrir o restante do material testando o balonete da sonda vesical, conectar a sonda vesical de demora a bolsa coletora, mantendo todo o sistema estéril
- 14- preencher a seringa com anestésico e uma segunda seringa com soro fisiológico
- 15- realizar a antissepsia do paciente seguindo a regra do mais limpo para o mais contaminado, de cima para baixo, da região genital para a perineal
- 16- colocar campo esterilizado, colocar o material sobre o campo esterilizado
- 17- segurar o pênis ou abrir os grandes lábios e realizar antissepsia do orifício do meato urinário
- 18- sem soltar a mão do local
- 19- realizar a anestesia do meato urinário com a xilocaína gel 2% (masculino introduzir dentro do meato urinário, e feminina aplicar a xilocaína na ponta da sonda vesical)
- 20- pegar a sonda vesical de demora e introduzir no meato sem que apresente resistência
- 21- após introduzir toda a sonda, preencher o balonete com o soro fisiológico
- 22- tracionar a sonda vesical de demora até encontrar leve resistência e o retorno da diurese
- 23- fixar a sonda vesical de demora masculino na região pubiana e feminino na região interna da coxa
- 24- fixar a bolsa coletora abaixo da linha da cintura
- 25- retirar o campo esterilizado, organizar a unidade e/ou o local da passagem da sonda
- 26- retirar a luva
- 27- guardar todo material
- 28- lavar as mãos
- 29- anotar no prontuário do paciente o procedimento
- 30- identificar na bolsa coletora a data da passagem e o nome do profissional que realizou o procedimento